

ÉXITO 10 CE[®]**I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA****Producto:** ÉXITO 10 CE**No Registro:** PQUA N° 095 -SENASA**Titular de registro:** POINT ANDINA S.A.**Distribuidor:** Comercial Andina Industrial S.A.C**Clase de uso:** INSECTICIDA AGRICOLA**II. INGREDIENTES ACTIVOS**

Alfacipermetrina 100 g/L

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

- Estado Físico: líquido
- Color: amarillo claro cristalino
- Olor: característico a solvente aromático
- Densidad: 0.915-0.925 g/ml
- pH: 5.5
- Solubilidad en agua: soluble
- Inflamabilidad: no inflamable
- Explosividad: no explosivo
- Corrosividad: no corrosivo
- Estabilidad de almacenamiento: 2 años

IV. FORMULACION

Concentrado emulsionable –EC

V. MODO Y MECANISMO DE ACCION

EXITO 10 CE es un insecticida no sistémico, que actúa por contacto (acción superficial) o por ingestión (acción estomacal).

EXITO 10 CE, actúa sobre el sistema nervioso central y periférico de los insectos. Impide la transmisión de los impulsos a lo largo de los nervios, provocando el bloqueo del paso de los iones sodio a través de los canales de sodio en las membranas

nerviosas; así evita el paso de la transmisión nerviosa por los axones de las neuronas. Típicamente, esta intoxicación resulta en un efecto de derribe y posterior muerte del insecto.

VI. USOS REGISTRADOS

Cultivo	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS mL/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Alfalfa	"Gusano ejército"	<i>Spodoptera spp.</i>	125	14	0.5
Algodón	"Gusano rosado"	<i>Pectinophora gossypiella</i>	125	14	0.1
	"Arrebiatado"	<i>Dysdercus peruvianus</i>	125	14	0.1
Col	"Gusano de hoja"	<i>Plutella spp.</i>	125	14	1
Frijol	"Gusano medidor"	<i>Pseudoplusia spp.</i>	150	14	0.05
Maíz	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	125	14	0.05
Papa	"Mosca minadora (adultos)"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	100	14	0.05
Sandia	"Perforador de guías"	<i>Diaphania spp.</i>	125	14	0.05
Tomate	"Polilla"	<i>Tuta absoluta</i>	150	14	0.1

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm).

P.C.: Periodo de Carencia en días.

VII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas. Realizar un máximo de 4 aplicaciones/campaña/año.

VIII. CATEGORIA TOXICOLOGICA

Categoría II – Moderadamente peligroso – Dañino

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

File: F.T. / **EXITO 10 CE** / 01-06-2022