SUNNER 500 SC ®

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA

Producto: SUNNER 500 SC

No Registro: PQUA N° 332 -SENASA

Titular de registro: Comercial Andina Industrial S.A.C

Distribuidor: Comercial Andina Industrial S.A.C

Clase de uso: FUNGICIDA AGRICOLA

II. INGREDIENTES ACTIVOS

Carbendazim 500 g/L

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

- Estado Físico: Liquido
- Color: Blanco
- Olor: Característico a los compuestos
- Densidad: 1.15 g/ml a 20ºC
- pH: 6 - 9 (al 1% de solución)
- Solubilidad en agua: Soluble
- Inflamabilidad: No inflamable
- Explosividad: No explosivo
- Corrosividad: No corrosivo
- Estabilidad de almacenamiento: 2 años

IV. FORMULACION

Suspensión Concentrada – SC

V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SUNNER 500 SC es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa, que es absorbido por el follaje y por las raíces de la planta y se trasloca en dirección acropétala.

Av. Benavides 1579, Of. 701-702-703, Edificio Del Park II, Miraflores, Lima - Perú. (01) 255-2830 / atenciónalcliente@grupoandina.com.pe
www.grupoandina.com.pe

VI. MODO Y MECANISMO DE ACCION

SUNNER 500 SC afecta a los hongos por inhibición de la mitosis durante el enlance de la tubulina, afectando la división nuclear y celular, resultando finalmente en la muerte de la célula.

VII. USOS REGISTRADOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/ha		
ALCACHOFA	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	0.35	-	21	0.1
ESPÁRRAGO	"Roya"	Puccinia asparagi	0.1 – 0.2	0.2 – 0.4	5	0.2
FRESA	"Moho gris/podredumbre gris"	Botrytis cinerea	-	0.4	15	0.1
MANDARINA	"Moho gris"	Botrytis cinerea	0.2 – 0.25	-	15	0.7
PALTO	"Moho gris"	Botrytis cinerea	0.25	-	14	0.1
PIMIENTO	"Oidium"	Leveillula taurica	0.25	0.5	7	2
VID	"Moho gris"	Botrytis cinerea	0.2 – 0.25	-	15	0.3

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad o a la presencia de los síntomas iniciales de la enfermedad. Se recomienda rotar con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción. Realizar 1 aplicación de carbendazim por campaña al año como máximo.

IX. CATEGORIA TOXICOLOGICA

Categoría III – Ligeramente peligroso – Cuidado

Av. Benavides 1579, Of. 701-702-703, Edificio Del Park II, Miraflores, Lima - Perú. (01) 255-2830 / atenciónalcliente@grupoandina.com.pe
www.grupoandina.com.pe

X. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

File: F.T. / **SUNNER 500 SC** / 16-01-2025

Av. Benavides 1579, Of. 701-702-703, Edificio Del Park II, Miraflores, Lima - Perú. (01) 255-2830 / atenciónalcliente@grupoandina.com.pe
www.grupoandina.com.pe