

## TROFEO

### I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA

**Producto:** TROFEO

**No Registro:** PQUA N° 1574 -SENASA

**Titular de registro:** Comercial Andina Industrial S.A.C

**Distribuidor:** Comercial Andina Industrial S.A.C

**Clase de uso:** INSECTICIDA AGRICOLA

**Fecha de actualización:** 21/11/2025

### II. INGREDIENTES ACTIVOS

Fipronil 400 g/kg + Imidacloprid 400 g/kg

### III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

- Estado Físico: Solido
- Color: Blanco a blanco humo
- Olor: Característico
- Densidad: No aplica
- pH: 8.5 ± 2.5 (1% en solución)
- Solubilidad en agua: Soluble
- Inflamabilidad: No inflamable
- Explosividad: No explosivo
- Corrosividad: No corrosivo
- Estabilidad de almacenamiento: 2 años

### IV. FORMULACION

Gránulo Dispersable - WG

### V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

TROFEO es un insecticida que actúa por contacto, ingestión y vía sistémica. Su mecanismo de acción afecta el funcionamiento del sistema nervioso de los insectos.

Su adecuada formulación le confiere una excelente suspensibilidad en la mezcla de aplicación, logrando de esta manera realizar una aplicación uniforme sobre los cultivos.

## VI. MODO Y MECANISMO DE ACCION

Fipronil del grupo de los Fenylpyrazoles tiene una acción antagonista del canal de sodio e Imidacloprid del grupo de los Neonicotinoides es antagonista de los receptores nicotínicos.

## VII. USOS REGISTRADOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/ 200 L	kg/ha		
Arroz	Mosca minadora	<i>Hydrelia wirthi</i>	-	0.1*	21	0.01 Fipronil 1.5 Imidacloprid
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	-	0.40*	14	0.02 Fipronil 0.1 Imidacloprid
Espárrago	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.200	-	21	0.005 Fipronil 0.05 Imidacloprid
Pimiento	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.100	-	21	0.005 Fipronil 1 Imidacloprid
Tomate	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.150	-	7	0.005 Fipronil 0.05 Imidacloprid

\*Para un volumen de agua de 400 L/ha

## VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar TROFEO (i.a. Fipronil + Imidacloprid) una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña al año.

## IX. CATEGORIA TOXICOLOGICA

Categoría II – Moderadamente Peligroso – Daño

## X. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones

ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

