

Frutyflor-PK®

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

Producto: FRUTYFLOR-PK 1-26-45
Formulador: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C
Distribuidor: FERTILIZANTES y SEMILLAS ANDINAS S.A.C., una empresa de GRUPO ANDINA
Clase: Fertilizante foliar

II. INGREDIENTES ACTIVOS (P/V)

Nitrógeno Total(N) 1.0 %
Fósforo Disponible (P_2O_5) 26.0 %
Potasio Soluble (K_2O) 45.0 %
Magnesio (MgO) 400 ppm
Hierro (Fe_2O_3) 100 ppm
Zinc (Zn) 100 ppm
Manganeso (Mn) 100 ppm
Cobre (Cu) 100 ppm
Boro (B) 85 ppm

III. CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

Estado Físico	Líquido
Color	Azul
Olor	Característico
pH	7.5 ± 1.0
Densidad (g/mL) a 20 °C	1.35 ± 0.05
Solubilidad en agua	Soluble
Inflamabilidad	No inflamable
Explosividad	No explosivo
Corrosividad	No corrosivo
Estabilidad de almacenamiento	Estable 3 años

IV. FORMULACIÓN

CONCENTRADO SOLUBLE - (SL)

V. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **FRUTYFLOR-PK®** es un fertilizante foliar líquido concentrado con un alto contenido en Fósforo (P) y Potasio (K), más microelementos

VI. MODO Y/O MECANISMO DE ACCION

- **FRUTYFLOR-PK®** induce y estimula la multiplicación de los órganos florales y fruteros; asegurando un cuajado y desarrollo final de los frutos. Los microelementos proporcionan a los cultivos en general los elementos necesarios para su normal desarrollo, corrigiendo deficiencias de los mismos.

VII. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS		ÉPOCA Y N° DE APLICACIONES
	L/ha	L/ 200L	
Papa	2	1	1° Al inicio de floración antes del aporque, en mezcla con Big-Hor. 2° A los 25 días de la anterior aplicación para mejor tuberización en mezcla con Nitrosol-N.
Algodón	2	1	1° Al inicio de la formación del botón floral, en mezcla con Keltex Calcio-Boro y Big-Hor. 2° A la formación de bellotitas en mezcla con Big-Hor.
Tomate, Ají, Pimiento, Páprika, Alcachofa, Espárrago	2	1	1° Al inicio de la floración para inducir mayor número de flores. 2° A los 20 a 25 días de la primera, una vez cuajado los frutos. En ambas aplicaciones con Big-Hor, para evitar caída de flores y frutos. Un mes antes de la cosecha.
Fríjol, Vainita, Arveja, Pallar, Garbanzo	2	1	1° A la floración para inducir a la multiplicación de flores. 2° A los 15 a 20 días de la primera. En mezcla con Big-Hor.
Zapallo, Sandía, Pepinillo, Zapallo italiano	2	1	1° Al inicio de la floración para la multiplicación de flores. 2° A los 20 a 25 días de la primera. En ambos conviene en mezcla con Big-Hor, para evitar la caída de flores y frutos, respectivamente.
Arroz, Apio, Poro, Nabo, Ajo, Col, Cebolla, Coliflor, Zanahoria	2	1	1° A los 25 a 30 días de siembra o trasplante. 2° De 20 a 25 días de la primera aplicación. En ambas aplicaciones en mezcla con Big-Hor.
Frutales: Arándano, Cítricos, Palto Melocotón, Manzano, Peral, Mango, vid	3-5	1	1° Al inicio de la floración. 2° Al cuajado de los frutos. En ambas aplicaciones en mezcla con Big-Hor para evitar caída de flores y frutos.
Marigold, Rosas	2	1	1° Al inicio de la formación de flores, mezclada con Big-Hor. 2° Después de cada cosecha, para mejorar la floración siguiente.

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

- **FRUTYFLOR-PK®** se recomienda aplicarlo en un primer momento antes del inicio de la floración y una segunda aplicación inmediatamente después del cuajado de los frutos y/o formación de éstos.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios,

pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

File: F.T. / **FRUTYFLOR-PK** / 06.10.2025