

FULVIKO

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA

Producto: FULVIKO®
Formulador: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C
Distribuidor: FERTILIZANTES y SEMILLAS ANDINAS S.A.C., una empresa de GRUPO ANDINA
Clase : Enmienda Humica líquido

Fecha de actualización: 03/11/2025

II. INGREDIENTES ACTIVOS (P/V)

Ácido Fúlvico 25 %
(Derivado de leonardita)
Auxiliares de formulación..... c.s.p. 1L

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Estado Físico	Líquido
Color	Negro
Olor	Característico.
Densidad	1.12 g/ml
pH	5.9
Solubilidad en agua	Miscible
Inflamabilidad	No inflamable
Explosividad	No explosivo
Corrosividad	No corrosivo
Estabilidad de almacenamiento	Estable 2 años

IV. FORMULACIÓN

CONCENTRADO SOLUBLE – (SL)

V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- **FULVIKO®** es una enmienda líquida con alto contenido de ácido fulvico derivado de Leonardita con acción complejante, que puede ser aplicado al área foliar o la zona radicular conjuntamente con los nutrientes de aplicación foliar, o los fertilizantes de uso convencional usados en fertirriego para favorecer su asimilación. Los acidos fulvicos contenidos en **FULVIKO®** mejora las características físicas, químicas y biológicas del suelo.

VI. MODO Y/O MECANISMO DE ACCION

- **FULVIKO®** es un complejante que interactúa con los nutrientes para una mejor absorción en el área

Código: GT-CAISAC-PR.01-FO.001
Fecha de creación: 12/05/2022
Nº de Versión: 00
Pág. 1 de 2

foliar y del sistema radicular.

- **FULVIKO®** desbloquea los elementos minerales retenidos en el suelo haciéndolo disponible para el cultivo.
- **FULVIKO®** aumenta la permeabilidad celular facilitando la absorción de los nutrientes.

VII. RECOMENDACIONES DE USO

- La dosis recomendada de **FULVIKO®** es de 5 a 10 litros por hectárea/aplicación vía sistema riego, hasta completar los 40 a 60 litros/ha por campaña. Y la dosis recomendada de **FULVIKO®** como complejante para la aplicación de nutrientes vía foliar es de 2 litros por hectárea/aplicación, pudiéndose aplicar en diferentes fases fenológicas del cultivo.
- **FULVIKO®** puede ser aplicado en diversos cultivos como los industriales, frutales (cítricos, palto, mango, olivo, vid, manzano, cacao, melocoton, arándano, granado, banano, etc), hortalizas (paprika, ají escabeche, pimentón, tomate, cebolla, ajo, etc), brócoli, alcachofa, ornamentales, anuales y perennes.

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

- **FULVIKO®** puede ser aplicado en diferentes fases fenológicas durante el desarrollo de los cultivo con frecuencias de 7 a días entre aplicación.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.