



## I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA

Producto: KELTEX CaB  
Formulador: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C  
Distribuidor: FERTILIZANTES y SEMILLAS ANDINAS S.A.C., una empresa de GRUPO ANDINA  
Clase : Fertilizante foliar de uso agrícola

Fecha de actualización: 03/11/2025

## II. INGREDIENTES ACTIVOS (P/V)

Calcio (CaO) .....	10.0 %
Boro(B) .....	1.0%
Ácidos Carboxilicos .....	6.0%
Magnesio (MgO) .....	600 ppm

## III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Estado Físico:	Líquido
Color:	Marrón claro
Olor.	Característico
Densidad	1.25 ± 0.05 g/ml
pH	4.2 ± 1.0
Solubilidad en agua:	Soluble
Inflamabilidad:	No inflamable
Explosividad:	No explosivo
Corrosividad :	No corrosivo

Estabilidad de almacenamiento: Estable 3 años

## IV. FORMULACIÓN

CONCENTRADO SOLUBLE - (SL)

## V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- **KELTEX CALCIO-BORO**, es un bionutriente, formulado con ácidos orgánicos y carboxílico activos diseñado para promover el cuajado de flores y amarre de frutos, evitando su caída excesiva.

## VI. MODO Y/O MECANISMO DE ACCION

- Los componentes quelatizados del **KELTEX CALCIO-BORO** actúan directamente sobre las plantas, el

Código: GT-CAISAC-PR.01-FO.001  
Fecha de creación: 12/05/2022  
Nº de Versión: 00  
Pág. 1 de 2

Calcio metabolizado da lugar a paredes celulares fuertes de las flores y frutos con mayor fortaleza; el Boro también cumple un papel importante en el transporte de azúcares y almidones de las hojas hacia los frutos. Ambos elementos son indispensables en las etapas de llenado de frutos y bulbos, lo que origina una mejor calidad de frutos cosechado. **KELTEX CALCIO-BORO** evita la caída de flores y frutos.

## VII. RECOMENDACIONES DE USO.

CULTIVO	DOSIS / 200 L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Arroz	0.5 - 1L	1° Punto de algodón. 2° Desarrollo de la espiga.
Espárrago	0.5 - 1L	1° Luego del primer corte: - Repetir 3-4 aplicaciones cada 15-20 días
Algodón, Pimiento, Tomate, Ají, Páprika	0.5 - 1L	1° Al inicio de la Floración. 2° Despues de la formación de los frutos.
Papa	0.5 - 1L	1° A los 40 a 50 días de la siembra, o antes del aporque. 2° A los 30 días de la primera aplicación.
Alcachofa	0.5 - 1L	Para la inducción de capítulos.
Frijol, Pallar, vainita, Arveja, Haba, Garbanzo	0.5 - 1L	1° Al inicio de la floración. 2° Despues del cuajado de las vainas.
Zapallo, Melón, pepinillo, Sandía	0.5 - 1L	1° Al inicio de la floración. 2° Despues del cuajado de frutos.
Frutales: Vid, Palto, Cítricos, Mango, Cacao y café	0.5 - 1L	1° Al inicio de la floración. 2° Despues del cuajado de frutos.

## VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

- **KELTEX CALCIO-BORO**, puede aplicarse en los cultivos según recomendaciones de la etiqueta comercial, sin embargo, de modo general su uso es antes de la floración y luego del cuajado de los frutos.

## IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.